



POLYSECT® ULTRA SL

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Contém 1,2-benzisotiazolina-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacção alérgica. Ler o rótulo antes da utilização.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Evitar a libertação para o ambiente.

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

Perigoso para as abelhas. Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

As embalagens vazias dos produtos fitofarmacêuticos de uso doméstico devem ser depositadas nos locais de recolha do lixo doméstico ou nos Ecopontos, de acordo com o respectivo material da embalagem. Telefone do CIAV (Centro de Informação Antivenenos): 808 250 143

Fabricado por:
Scotts France SAS

Scotts®

Distribuído por:
Liscampo, Lda
Travessa do Carvalho 31-35
1200-097 Lisboa
Tel.: 213 471 271



Volume net:
200 ml

ACETSLP
6890



Réf Liscampo
6141



3 121970 146226 >



LINHA JARDINS E HORTAS FAMILIARES

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO NÃO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

POLYSECT® ULTRA SL

**INSECTICIDA SISTÉMICO,
que actua por contacto e ingestão, para
o combate de afídeos, cochonilhas,
moscas brancas e tripses em roseiras,
culturas florais diversas, árvores
e arbustos ornamentais em
jardins familiares.**

Solução concentrada com 5 g/l
ou 0,5% (p/p) de acetamiprida
Autorização de Venda n.º 0194
concedida pela DGADR.

Volume líquido:
200 mL



POLYSECT® ULTRA SL

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Proteger os aquários e manter os animais domésticos afastados durante a utilização.

Não tocar nas plantas tratadas antes da secagem completa.

Efectuar um ensaio preliminar numa parte da planta a tratar antes de generalizar a aplicação, para avaliar possíveis efeitos fitotóxicos.

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha neonicotinóides mais de duas vezes por cultura e por ano.

MODO DE APLICAÇÃO

Deitar a dose de produto e o volume de água indicados dentro do pulverizador.

Agitar bem antes de aplicar, de modo a obter uma calda homogénea.

Tratar a totalidade da planta infestada, molhando as folhas e os ramos uniformemente.

Em caso de forte infestação, realizar novo tratamento após 14 a 21 dias.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilizar luvas durante a utilização.

Lavar as mãos e o rosto após utilização.

Lavar bem o pulverizador após utilização.

Não misturar Polysect Ultra SL com outros produtos.

Conservar o produto unicamente no seu recipiente original.

Não armazenar o produto a temperaturas negativas.

Não reutilizar as embalagens vazias.



POLYSECT® ULTRA SL

MODO DE ACÇÃO :

A acetamiprida pertence ao grupo químico dos neonicotinóides e actua no sistema nervoso dos insectos, sendo antagonista do receptor nicotínico da acetilcolina.

Acção rápida: agindo por contacto e ingestão, os primeiros resultados são visíveis em 24 horas (afídeos).

Acção preventiva: por ser sistémico o Polysect Ultra SL circula através da seiva das plantas tratadas e permanece activo durante 3 a 4 semanas, prevenindo, assim, as reinfestações.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO :

J F M A M J J A S O N D

Tratar com o tempo ameno e calmo, em dias sem chuva.

Tratar ao aparecimento das pragas ou dos primeiros estragos.

DOSE DE APLICAÇÃO :



Dose de aplicação recomendada:

10 ml de produto por litro de água.

CULTURA	INIMIGO	CONCENTRAÇÃO / DOSE
ÁRVORES E ARBUSTOS ORNAMENTAIS Bétulas (<i>Betula sp.</i>), Faias (<i>Fagus sp.</i>), Choupos (<i>Populus sp.</i>), Azáleas (<i>Azalea sp.</i>), Urzes (<i>Erica spp.</i>), Hibiscos (<i>Hibiscus sp.</i>), Loendros (<i>Nerium oleander</i>)	Afídeos (<i>Aphis sp.</i> , <i>Myzus persicae</i>), Cochonilhas (<i>Coccus sp.</i> , <i>Pseudococcus sp.</i>), Moscas brancas (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Tripes (<i>Thrips sp.</i>)	10 ml / L
ROSEIRAS	Afídeos (<i>Macrosiphum rosae</i> , <i>Mysaphis rosarum</i>), Cochonilhas (<i>Coccus sp.</i> , <i>Pseudococcus sp.</i>), Moscas brancas (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Tripes (<i>Thrips sp.</i>)	10 ml / 10 m ²
CULTURAS FLORAIS DIVERSAS Begónias (<i>Begonia sp.</i>), Crisântemos (<i>Chrysanthemum spp.</i>), Dális (<i>Dhalia sp.</i>), Petúnias (<i>Petunia spp.</i>), Sálvias (<i>Salvia sp.</i>), Cravos (<i>Tagetes spp.</i>)	Afídeos (<i>Aphis sp.</i> , <i>Myzus persicae</i>), Cochonilhas (<i>Coccus sp.</i> , <i>Pseudococcus sp.</i>), Moscas brancas (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Tripes (<i>Thrips sp.</i>)	10 ml / 10 m ²